

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA  
C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 1 - 21 janvier 1986

**P Ê C H E R** : TRAITEMENTS CONTRE LE PUCERON VERT ET LA CLOQUE  
**A B R I C O T I E R** : MESURES PROPHYLACTIQUES ET TRAITEMENT CONTRE  
LE MONILIA  
**P O I R I E R** : INTERVENIR RAPIDEMENT CONTRE LES PSYLLES  
**A S P E R G E** : TRAITEMENT DES GRIFFES

## ASPERGE

### RHIZOCTONE VIOLET - FUSARIOSE :

Le traitement des griffes avant plantation sera réalisé par deux opérations succes-  
sives, elles ne doivent en aucun cas être inversées:

- 1°) Trempage des griffes pendant 15 à 20 minutes dans une solution de Javel + eau  
(1 berlingot de 250 cm<sup>3</sup> dans 3/4 de litre d'eau).  
Faire suivre d'un rinçage immédiat et abondant, laisser égoutter.  
La solution doit être renouvelée dès que l'on n'a plus de décoloration sur les racines.
- 2°) Tremper les griffes pendant 30 minutes dans une solution de carbendazime et captafol  
(un litre de Céréal pour 100 litres d'eau).  
Ne pas rincer. Laisser égoutter.

## A T T E N T I O N

VOTRE ABONNEMENT TOUCHE À SA FIN. NOUS VOUS RAPPELONS QUE L'ÉDITION  
GÉNÉRALE VA DISPARAÎTRE ET SERA REMPLACÉE POUR LA CAMPAGNE A VENIR  
PAR 3 ÉDITIONS SPÉCIALISÉES :

- VITICULTURE
- ARBORICULTURE
- CULTURES LEGUMIÈRES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

7498



## PECHERS

### PUCERON VERT :

Les traitements d'hiver sont importants pour mener à bien la lutte contre le Puceron. Ils doivent être réalisés avant les éclosions des oeufs.

Effectuer sans tarder une application à l'aide de : DNOC (600 g de m.a./hl)

Sur foyers de Cochenilles, utiliser de préférence une association avec une huile.

Traiter par beau temps, en l'absence de vent, sur bois bien ressuyé

La pulvérisation sera très soignée :

- atteindre toutes les parties de l'arbre
- éviter les projections de produits sur les cultures voisines

Ne plus intervenir dès les premiers signes de réveil de la végétation.

Attention : au risque de phytotoxicité sur jeunes vergers ou sur bois mal aoutés (Armking, Springcrest, ...)

### CLOQUE :

La lutte contre cette maladie passe par une protection intégrale de la période : "ouverture des écailles des bourgeons à bois - étalement des jeunes feuilles" (Captafol, Captane, Ferbame, Thirame, Zirame).

Pour éviter les toutes premières contaminations :

• Ajouter 500 g de Cuivre métal/hl au DNOC

## ABRICOTIERS

### MONILIA :

Appliquer les mesures prophylactiques classiques : suppression des rameaux morts et des momies, curetage des chancres ...

Prévoir une application au stade C ("pointes rouges" du calice visibles) :  
Cuivre 500 g de cuivre métal/hl.

## POIRIERS

### PSYLLE :

Les femelles de psylle atteignent le stade de maturité sexuelle. Un traitement est donc à prévoir rapidement.

Réalisez l'intervention par beau temps, sans vent, vers le milieu de la journée.

Utilisez une spécialité à base de DNOC (600 g m.a./hl) ou un pyréthrianoïde de synthèse (Decis, Sumicidin 10, Ambush, Perthrine ou une spécialité à base de cyperméthrine).